



Nermin Okičić
Vedad Pašić

Funkcije više promjenljivih :
Krivolinijski integral

2016



Sadržaj

| | | |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Krivolinijski integral | 1 |
| 1.1 | Motivacija za krivolinijski integral | 2 |
| 1.2 | Krivolinijski integral prve vrste | 3 |
| 1.2.1 | Izračunavanje krivolinijskog integrala prve vrste | 7 |
| 1.3 | Krivolinijski integral druge vrste | 8 |
| 1.3.1 | Izračunavanje krivolinijskog integrala druge vrste | 10 |
| 1.4 | Nezavisnost integracije od putanje. Greenova formula | 12 |

Krivolinijski integral

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.1 Motivacija za krivolinijski integral | 2 |
| 1.2 Krivolinijski integral prve vrste | 3 |
| 1.2.1 Izračunavanje krivolinijskog integrala prve vrste . . | 7 |
| 1.3 Krivolinijski integral druge vrste | 8 |
| 1.3.1 Izračunavanje krivolinijskog integrala druge vrste . | 10 |
| 1.4 Nezavisnost integracije od putanje. Greenova formula | 12 |

Pojam određenog integrala, definisanog na nekom segmentu realne prave, u prethodnoj smo glavi uopštili proširujući integraciju na oblast u \mathbb{R}^2 i \mathbb{R}^3 prostoru. Sada ćemo uopštavanje izvršiti u drugom pravcu. Naime, ako za oblast integracije ne posmatramo segment prave linije, nego luk proizvoljne krive u prostoru, a podintegralna funkcija se definiše na tom luku, dolazimo do pojma krivolinijskog integrala.


Krivolinijski integral se koristi, kako u matematici, tako i u raznim primjenama (izračunavanje rada sile na putu, cirkulacija fluida, izračunavanje mase tijela itd.).

Uobičajeno se razmatraju dvije vrste krivolinijskih integrala, krivolinijski integral prve i krivolinijski integral druge vrste i mi ćemo ovdje uraditi isto uz napomenu da su sva razmatranja izvedena u prostoru \mathbb{R}^3 .

1.1 Motivacija za krivolinijski integral

Neka sila konstantnog intenziteta F djeluje u pravcu kretanja na objekat duž prave linije, i neka se pri tome objekat pomjeri za dužinu s . Veličinu Fs nazivamo rad sile F na putu s i označavamo je sa A (Slika 1.1 a)).


1.1. Motivacija za krivolinijski integral



Slika 1.1: Rad sile na pravolinijskom putu

Opštije, ukoliko sila konstantnog intenziteta F djeluje pod nekim uglom na objekt koji se kreće pravolinijski, tada se rad ostvaruje silom čiji je intenzitet projekcija sile F na vektor kretanja \vec{s} (Slika 1.1 b)).

Uopštimo dalje razmatranje tako što ćemo posmatrati kretanje objekta po proizvoljnoj putanji c , na kojeg djeluje sila ovisna o trenutnoj poziciji objekta na putanji. U trenutku t_* , objekt se kreće u pravcu $D\varphi(t_*)$, a na njega djeluje sila $F(\varphi(t_*))$.



Slika 1.2: Kretanje objekta duž krive c pod djelovanjem sile F

U opštem slučaju, silu F reprezentuje funkcija $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ (vektorsko polje). Kriva po kojoj se objekt kreće je jednodimenzionalni objekt u prostoru i kao takva, može se predstaviti funkcijom jedne varijable $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, koju nazivamo *parametrizacija krive c* i za koju pretpostavljamo da je glatka kriva.

Za izračunati rad koji izvrši sila F kada se objekt pomjeri iz tačke $\varphi(a)$ u tačku $\varphi(b)$, prvo interval $[a, b]$ podijelimo na m podintervala dužine

$$\Delta t = \frac{b - a}{m},$$

(podjela ne mora biti ravnomjerna) tačkama $a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_m = b$. Sada, u trenutku t_k ($k = 0, 1, \dots, m - 1$), objekt se kreće u pravcu $D\varphi(t_k) = \varphi'(t_k)$, brzinom $\|D\varphi(t_k)\|$ i prelazi put $\|D\varphi(t_k)\|\Delta t$ do trenutka t_{k+1} . Označimo li sa A_k rad sile F na putu od $\varphi(t_k)$ do $\varphi(t_{k+1})$, imamo

$$A_k \approx F(\varphi(t_k)) \cdot D\varphi(t_k)\Delta t.$$

1.2. Krivolinijski integral prve vrste

Naravno, sada je rad na putu od $\varphi(a)$ do $\varphi(b)$ dat sa

$$A \approx \sum_{i=0}^{m-1} A_k = \sum_{i=0}^{m-1} F(\varphi(t_k)) \cdot D\varphi(t_k) \Delta t .$$

Puštajući da m neograničeno raste (sve sitnije i sitnije podjele), dobijamo

$$A = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{m-1} F(\varphi(t_k)) \cdot D\varphi(t_k) \Delta t = \int_a^b F(\varphi(t)) \cdot D\varphi(t) dt .$$


1.2 Krivolinijski integral prve vrste

Posmatrajmo u prostoru $Oxyz$ dio krive L od tačke A do tačke B , koja se može rektificirati i koja nema samopresjeka. Neka su njene jednačine date sa

$$x = x(t) , y = y(t) , z = z(t) ; t \in [\alpha, \beta] . \quad (1.2.1)$$

Neka je funkcija $f(x, y, z)$ definisana i ograničena na krivoj L . Podijelimo segment $[\alpha, \beta]$ na n dijelova, $\alpha = t_0 < t_1 < \dots < t_n = \beta$. Svakoj vrijednosti t_i , $i = 1, 2, \dots, n$ odgovara na krivoj tačka A_i čije su koordinate (x_i, y_i, z_i) , gdje je $x_i = x(t_i)$, $y_i = y(t_i)$ i $z_i = z(t_i)$. Specijalno, za $t = t_0$ imamo tačku $A(x_0, y_0, z_0)$ i za $t = t_n$ tačku $B(x_n, y_n, z_n)$. Na svakom segmentu $[t_{i-1}, t_i]$ izaberimo proizvoljnu vrijednost τ_i parametra t . Ovoj vrijednosti odgovara tačka $M_i(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$ krive L , pri čemu je

$$\xi_i = x(\tau_i) , \eta_i = y(\tau_i) , \zeta_i = z(\tau_i) ; i = 1, 2, \dots, n .$$



Slika 1.3: Podjela luka krive.

Sa Δs_i označimo dužinu luka $A_{i-1}A_i$ krive L . Posmatrajmo sljedeću integralnu sumu

$$\sigma(f, L) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i \quad (1.2.2)$$

1.2. Krivolinijski integral prve vrste

Za broj I kažemo da je limes integralne sume $\sigma(f, L)$ kada $\max \Delta s_i$ teži 0, u oznaci

$$\lim_{\max \Delta s_i \rightarrow 0} \sigma(f, L) = I ,$$

ako za svako $\varepsilon > 0$, postoji $\delta > 0$, tako da je $|\sigma(f, L) - I| < \varepsilon$ za $\max \Delta s_i < \delta$ i za proizvoljan izbor tačaka (ξ_i, η_i, ζ_i) na luku $A_{i-1}A_i$.

Definicija 1.2.1

Ako za funkciju $f(x, y, z)$ definisanu i ograničenu na luku $L = \widehat{AB}$ postoji $\lim_{\max \Delta s_i \rightarrow 0} \sigma(f, L) = I$, onda se I naziva krivolinijski integral prve vrste funkcije $f(x, y, z)$ po krivoj L i označava se sa

$$I = \int_L f(x, y, z) ds \text{ ili } I = \int_{AB} f(x, y, z) ds .$$

Često ćemo umjesto o krivoj integracije govoriti o luku ili putanji integracije i nadalje ćemo podrazumijevati da je L dio-po-dio glatka kriva, a da je $f(x, y, z)$ ograničena na L i neprekidna u svim tačkama krive L , osim u njih konačno mnogo. Ove posljednje pretpostavke su ustvari neophodni uslovi postojanja krivolinijskog integrala prve vrste. Sljedećim teoremom navodimo neke od osnovnih svojstava ovog integrala.

Teorem 1.2.1: Aditivnost i homogenost po podintegralnoj funkciji

Neka je $L = \widehat{AB} \subset \mathbb{R}^3$ dio-po-dio glatka kriva bez samopresjeka i neka su f i g funkcije definisane na luku L tako da integrali $\int_L f(x, y, z) ds$ i $\int_L g(x, y, z) ds$ postoje. Za $a, b \in \mathbb{R}$ vrijedi

$$\int_L (af(x, y, z) + bg(x, y, z)) ds = a \int_L f(x, y, z) ds + b \int_L g(x, y, z) ds .$$

Dokaz : Dokaz ove činjenice slijedi direktno iz osobina konačnih suma.

$$\sum_{i=1}^n [af(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) + bg(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)] \Delta s_i = a \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i + b \sum_{i=1}^n g(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i .$$

Prelaskom na limes kada $\max \Delta s_i \rightarrow 0$ dobija se tvrdnja. ♣

Teorem 1.2.2: Aditivnost po luku integracije

Neka je $L = \widehat{AB} \subset \mathbb{R}^3$ dio-po-dio glatka kriva bez samopresjeka. Za proizvoljnu tačku C luka L , između tačaka A i B vrijedi

$$\int_{AB} f(x, y, z) ds = \int_{AC} f(x, y, z) ds + \int_{CB} f(x, y, z) ds .$$

Dokaz : Pri podjeli luka AB tačkama A_i , kao jednu od podionih tačaka izaberimo i tačku C i fiksirajmo je. Integralna suma $\sigma(f, L)$ može se simbolički zapisati u obliku

$$\sigma(f, L) = \sum_{AC} f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i + \sum_{CB} f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i ,$$

gdje podrazumijevamo da u prvoj sumi sumiramo po onim tačkama A_i koje su na luku AC , a u drugoj sumi po tačkama koje su na luku CB . Prelaskom na limes kada $\max \Delta s_i \rightarrow 0$ dobija se tražena tvrdnja. ♣

Teorem 1.2.3

Neka je $L = \widehat{AB} \subset \mathbb{R}^3$ dio-po-dio glatka kriva bez samopresjeka i neka su dalje f i g funkcije definisane na luku L tako da integrali $\int_L f(x, y, z) ds$ i $\int_L g(x, y, z) ds$ postoje.

1. $|\int_L f(x, y, z) ds| \leq \int_L |(x, y, z)| ds$.
2. Ako je $f(x, y, z) \leq g(x, y, z)$ za $(x, y, z) \in L$, onda je

$$\int_L f(x, y, z) ds \leq \int_L g(x, y, z) ds .$$

Dokaz :

1. Slijedi iz uopštene nejednakosti trougla

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)| \Delta s_i .$$

2. Iz nejednakosti $f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \leq g(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$, slijedi $\sigma(f, L) \leq \sigma(g, L)$, što direktno daje traženo tvrđenje.

♣

1.2. Krivolinijski integral prve vrste

Teorem 1.2.4

Neka je $f(x, y, z)$ neprekidna funkcija na luku L . Postoji $M^*(x^*, y^*, z^*)$ na luku L , takva da vrijedi

$$\int_L f(x, y, z) ds = f(x^*, y^*, z^*) \cdot l(L) ,$$

gdje smo sa $l(L)$ označili dužinu luka L .

Jedna važna osobina krivolinijskog integrala prve vrste iskazana je slijedećim teoremom.

Teorem 1.2.5

Ako postoji $\int_{AB} f(x, y, z) ds$, onda vrijedi

$$\int_{AB} f(x, y, z) ds = \int_{BA} f(x, y, z) ds .$$

Dokaz : Dokaz slijedi iz činjenice da veličina Δs_i predstavlja dužinu luka od tačke A_{i-1} do tačke A_i , pa je očigledno svejedno da li tu dužinu posmatramo od A_{i-1} do A_i ili od A_i do A_{i-1} . ♣

1.2.1 Izračunavanje krivolinijskog integrala prve vrste

Slijedećim teoremom dajemo pravilo za izračunavanje krivolinijskog integrala prve vrste.

Teorem 1.2.6

Neka je luk krive $L = AB$ zadat jednačinama

$$x = x(t) , y = y(t) , z = z(t) ; t \in [\alpha, \beta] ,$$

glatka kriva bez samopresjeka i neka je $f(x, y, z)$ neprekidna funkcija na luku L . Tada vrijedi formula


$$\int_{AB} f(x, y, z) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt . \quad (1.2.3)$$

1.2. Krivolinijski integral prve vrste

Vidimo da se u stvari krivolinijski integral prve vrste, tj. ako je luk L zadat parametarskim jednačinama, svodi na obični Riemannov integral jedne varijable.

Primjer 1.1. Izračunati $\int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds$, gdje je luk L zadat parametarskim jednačinama kružne zavojnice

$$L : x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt; t \in [0, \pi].$$



Na osnovu formule 1.2.3 imamo

$$\begin{aligned} \int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds &= \int_0^\pi (a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t + b^2 t^2) \sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + b^2} dt \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} \int_0^\pi (a^2 + b^2 t^2) dt \\ &= \left(\pi a^2 + \frac{1}{3} \pi^3 b^2 \right) \sqrt{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

◇

Primjer 1.2. Izračunati: $\int_{AB} (x + y + z) ds$, gdje je luk dio prave od tačke $A(1, 1, 1)$ do tačke $B(3, 3, 3)$.

Jednačina prave zadata tačkama A i B je $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{2}$ ili u parametarskom obliku $x = 2t + 1$, $y = 2t + 1$, $z = 2t + 1$, pa je na osnovu formule 1.2.3

$$\begin{aligned} \int_{AB} (x + y + z) ds &= \int_0^1 (2t + 1 + 2t + 1 + 2t + 1) \sqrt{12} dt \\ &= 2\sqrt{3} \int_0^1 (6t + 3) dt \\ &= 12\sqrt{3} \end{aligned}$$

◇

1.3 Krivolinijski integral druge vrste

Neka je kriva L u prostoru data jednačinama

$$x = x(t) , y = y(t) , z = z(t) ; t \in [\alpha, \beta]$$

i neka su funkcije $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$ i $R(x, y, z)$ definisane i ograničene na luku L . Podjelimo segment $[\alpha, \beta]$ na n dijelova tačkama t_i i na svakom podsegmentu $[t_{i-1}, t_i]$ izaberimo proizvoljnu vrijednost τ_i , $i = 1, 2, \dots, n$. Vrijednostima t_i odnosno τ_i odgovaraju tačke $A_i(x_i, y_i, z_i)$, odnosno $M_i(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$, pri čemu je $x_i = x(t_i)$, $y_i = y(t_i)$, $z_i = z(t_i)$, $\xi_i = x(\tau_i)$, $\eta_i = y(\tau_i)$ i $\zeta_i = z(\tau_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$. Uvedimo još oznake $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $\Delta y_i = y_i - y_{i-1}$ i $\Delta z_i = z_i - z_{i-1}$.

Sada možemo formirati slijedeće integralne sume

$$\sigma_1(P, L) = \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta x_i ,$$

$$\sigma_2(Q, L) = \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta y_i ,$$

$$\sigma_3(R, L) = \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta z_i .$$

Definicija 1.3.1

Neka za funkciju $P(x, y, z)$ ($Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$), definisanu na luku L , postoji limes integralne sume $\sigma_1(P, L)$ ($\sigma_2(Q, L)$, $\sigma_3(R, L)$) kada $\max \Delta x_i \rightarrow 0$ ($\max \Delta y_i \rightarrow 0$, $\max \Delta z_i \rightarrow 0$), tada se on naziva krivolinijskim integralom druge vrste funkcije $P(x, y, z)$ ($Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$) po luku L i označava se sa

$$\int_L P(x, y, z) dx \quad \left(\int_L Q(x, y, z) dy , \int_L R(x, y, z) dz \right) .$$

Zbir $\int_L P(x, y, z) dx + \int_L Q(x, y, z) dy + \int_L R(x, y, z) dz$ se obično zapisuje u skraćenoj formi

$$\int_L P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz$$

i naziva se (opštim) krivolinijskim integralom druge vrste.

1.3. Krivolinijski integral druge vrste

Narednim teoremama dajemo osobine krivolinijskog integrala druge vrste koje su identične osobinama krivolinijskog integrala prve vrste.

Teorem 1.3.1: Aditivnost i homogenost po podintegralnoj funkciji

Neka je $L = AB$ luk krive, P i P_1 funkcije definisane na luku L i neka postoje integrali $\int_L P(x, y, z)dx$ i $\int_L P_1(x, y, z)dx$. Za proizvoljne $a, b \in \mathbb{R}$ vrijedi

$$\int_L (aP(x, y, z) + bP_1(x, y, z))dx = a \int_L P(x, y, z)dx + b \int_L P_1(x, y, z)dx .$$

Teorem 1.3.2: Aditivnost po luku integracije

Neka je $L = AB$ luk krive i neka je $C \in L$ između tačaka A i B . Tada vrijedi

$$\int_{AB} P(x, y, z)dx = \int_{AC} P(x, y, z)dx + \int_{CB} P(x, y, z)dx .$$

Teorem 1.3.3

Ako je $P(x, y, z)$ neprekidna funkcija na luku AB , onda postoji tačka $M^*(x^*, y^*, z^*)$ na luku AB , takva da je

$$\int_{AB} P(x, y, z)dx = P(x^*, y^*, z^*)(b - a) ,$$

gdje je $x(\alpha) = a$, $x(\beta) = b$.

Sada ćemo vidjeti da slijedeće svojstvo nije jednako kod krivolinijskih integrala prve i druge vrste.

Teorem 1.3.4

Ako postoji integral $\int_{AB} P(x, y, z)dx$, tada vrijedi

$$\int_{AB} P(x, y, z)dx = - \int_{BA} P(x, y, z)dx .$$

Dokaz : Sami! ♣

1.3.1 Izračunavanje krivolinijskog integrala druge vrste

Teorem 1.3.5

Neka je kriva AB zadata jednačinama

$$x = x(t) , y = y(t) , z = z(t) ; t \in [\alpha, \beta] ,$$

glatka i nema singularnih tačaka i neka je funkcija $P(x, y, z)$ neprekidna na luku AB . Tada važi formula

$$\int_{AB} P(x, y, z) dx = \int_{\alpha}^{\beta} P(x(t), y(t), z(t)) \cdot x'(t) dt . \quad (1.3.1)$$

Analogno se iskazuje tvrdnja i za funkcije Q i R , tj.

$$\int_{AB} Q(x, y, z) dx = \int_{\alpha}^{\beta} Q(x(t), y(t), z(t)) \cdot y'(t) dt ,$$

$$\int_{AB} R(x, y, z) dx = \int_{\alpha}^{\beta} R(x(t), y(t), z(t)) \cdot z'(t) dt .$$

Sada za sumarnu formulu imamo

$$\int_{AB} P dx + Q dy + R dz = \int_{\alpha}^{\beta} (Px'(t) + Qy'(t) + Rz'(t)) dt . \quad (1.3.2)$$

Primjer 1.3. Izračunati: $\int_L (x^2 - 2xy) dx + (y^2 - 2xy) dy$, gdje je L luk parabole $y = x^2$, od tačke $A(-1, 1)$ do tačke $B(1, 1)$.

Za parametar krive uzimamo x . Formula 1.3.2 nam daje ($R = 0$)


$$\begin{aligned} \int_L (x^2 - 2xy) dx + (y^2 - 2xy) dy &= \int_{-1}^1 (x^2 - 2x^3 + 2x^5 - 4x^4) dx \\ &= -\frac{14}{15} . \end{aligned}$$

◇

Primjer 1.4. Izračunati: $\int_L (y - z) dx + (z - x) dy + (x - y) dz$, gdje je L kružnica određena sferom $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ i ravni $y = x$. Pri tome je smjer integracije suprotan kretanju kazaljke na satu, ako se gleda iz pozitivnog dijela x -ose.

Za parametar očigledno možemo izabrati ugao između radijus-vektora tačke na kružnici i ekvatorijalne ravni. Iz sfernih koordinata onda imamo

$$x = \frac{a\sqrt{2}}{2} \cos t , y = \frac{a\sqrt{2}}{2} \cos t , z = a \sin t ,$$



Slika 1.4: Presjek sfere i ravni.

pri čemu se zbog zadate orijentacije, parametar t mijenja od 0 do 2π . Sada na osnovu formule 1.3.2 imamo

$$\begin{aligned} \int_L (y - z)dx + (z - x)dy + (x - y)dz &= \\ &= \int_0^{2\pi} \left[-\frac{a^2\sqrt{2}}{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos t - \sin t \right) \sin t - \frac{a^2\sqrt{2}}{2} \left(\sin t - \frac{\sqrt{2}}{2} \cos t \right) \sin t \right] dt \\ &= 0. \end{aligned}$$

◇

1.4 Nezavisnost integracije od putanje. Greenova formula

Krivolinijski integral druge vrste u opštem slučaju zavisi od putanje po kojoj se vrši integracija (Teorem 1.3.4). Međutim, to nije uvijek slučaj. Ukoliko izraz $Pdx + Qdy + Rdz$ predstavlja totalni diferencijal neke funkcije tri promjenljive $u(x, y, z)$ to jest,

$$du(x, y, z) = P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz,$$

onda integral vektora $(P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ po luku $L = AB$ zavisi samo od tačaka A i B , a ne i od linije kojom su te tačke povezane. Ovo razmatranje ćemo iskazati teoremom,

Teorem 1.4.1

Neka je u oblasti $V \subset \mathbb{R}^3$ zadata neprekidna vektorska funkcija

$$\vec{v} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)) .$$

Tada su sljedeća tvrđenja ekvivalentna:

1. Postoji funkcija $u(x, y, z)$ sa neprekidnim prvim parcijalnim izvodima, definisana u oblasti V , takva da je

$$\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y, z) , \quad \frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y, z) , \quad \frac{\partial u}{\partial z} = R(x, y, z) .$$

2. Krivolinijski integral druge vrste $\int_{AB} Pdx + Qdy + Rdz$ po putanji $AB \subset V$, gdje su $A(x_0, y_0, z_0)$ i $B(x_1, y_1, z_1)$ početna, odnosno krajnja tačka te putanje, ne zavisi od oblika putanje, nego samo od tačaka A i B . Pri tome vrijedi

$$\int_{AB} Pdx + Qdy + Rdz = u(x_1, y_1, z_1) - u(x_0, y_0, z_0) .$$

3. Krivolinijski integral

$$\oint_c Pdx + Qdy + Rdz$$

po proizvoljnoj zatvorenoj putanji $c \subset V$ jednak je nuli.

Na osnovu gornjeg teorema jasno je da se problem izračunavanja krivolinijskog integrala druge vrste, kada on ne ovisi o putu integracije, svodi na raspoznavanje kada je podintegralna funkcija totalni diferencijal neke vektorske funkcije. Zato nam je od interesa dati još neki kriterijum za takvo "raspoznavanje". Za naredni teorem neophodan nam je slijedeći pojam.

Definicija 1.4.1

Za oblast $V \subset \mathbb{R}^3$ kažemo da je prosto povezana ako se svaka zatvorena dio-po-dio glatka kriva $c \subset V$, može "stegnuti" u proizvoljnu tačku $M_0 \in c$, ostajući pri tome u oblasti V .

Strogu matematičku formulaciju pojma "stegnuti" ovdje nećemo razmatrati. Neka on ostane u domenu intuitivnog, ali navedimo neke primjere prosto

1.4. Nezavisnost integracije od putanje. Greenova formula

povezanih i nepovezanih oblasti. Unutrašnjost proizvoljnog kruga i kvadrata su prosto povezane oblasti u \mathbb{R}^2 , ali krug bez svog centra to nije. U \mathbb{R}^3 primjer prosto povezane oblasti su lopta i kocka, takođe i oblast ograničena dvjema koncentričnim sferama. Torus je primjer oblasti u \mathbb{R}^3 koja nije prosto povezana.

Teorem 1.4.2

Neka je u prosto povezanoj oblasti $V \subset \mathbb{R}^3$ zadata neprekidna vektorska funkcija $\vec{v} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ koja ima neprekidne parcijalne izvode $\frac{\partial P}{\partial y}$, $\frac{\partial P}{\partial z}$, $\frac{\partial Q}{\partial x}$, $\frac{\partial Q}{\partial z}$, $\frac{\partial R}{\partial x}$ i $\frac{\partial R}{\partial y}$. Potreban i dovoljan uslov da integral $\int_{AB} Pdx + Qdy + Rdz$, $AB \subset V$, ne zavisi od putanje AB , jeste da su ispunjeni uslovi

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}, \quad \frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial z}.$$

Primjer 1.5. Izračunati:

$$\oint_c \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy,$$

po putanji c koja predstavlja kružnicu $(x - 3)^2 + y^2 = 1$.

Kako su $P(x, y) = \frac{-y}{x^2 + y^2}$ i $Q(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$ neprekidne u oblasti ograničenoj krivom c i kako su

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

i uz to neprekidne funkcije u istoj oblasti, to na osnovu Teorema 1.4.1 zaključujemo da je dati integral jednak 0. \diamond

Primjer 1.6. Izračunati:

$$\oint_c \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy,$$

po putanji c koja predstavlja kružnicu $x = a \cos t$, $y = a \sin t$, $t \in [0, 2\pi]$.

Za razliku od gornjeg primjera, ovdje su funkcije P, Q , $\frac{\partial P}{\partial y}$ i $\frac{\partial Q}{\partial x}$ neprekidne u svim tačkama oblasti ograničenom krivom c osim u tački $(0, 0)$, koja se nalazi unutar te oblasti. Naravno, mogli bi ne posmatrati tu tačku, ali oblast datog kruga bez tačke $(0, 0)$ nije onda prosto povezana pa se ne možemo pozvati na prethodne dvije teoreme. Zato izračunavanju ovog integrala


1.4. Nezavisnost integracije od putanje. Greenova formula

pristupamo na klasičan način.

$$\begin{aligned} \oint_c \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{-a \sin t}{a^2} (-a \sin t) + \frac{a \cos t}{a^2} a \cos t \right) dt \\ &= 2\pi . \end{aligned}$$

◇

Veza između dvojnog integrala po nekoj oblasti i krivolinijskog integrala po granici te oblasti data je poznatom *Greenovom formulom*. Uočimo prostu zatvorenu krivu $c \subset \mathbb{R}^2$ koja ograničava oblast D . Ako se c sastoji od dijelova grafika dviju neprekidnih funkcija f i g , definisanih na $[a, b]$ i takvih da je $f(x) \leq g(x)$ za $x \in [a, b]$, i eventualno dijelova pravih $x = a$ i $x = b$, onda ćemo oblast D nazvati elementarnom oblašću u odnosu na osu Ox . Na sličan bi način definisali elementarnu oblast u odnosu na osu Oy . Oblasti koje su elementarne u odnosu na obje ose zovemo prosto elementarnim oblastima.



(a) Elementarna oblast u odnosu na Ox (b) Elementarna oblast u odnosu na Oy

Teorem 1.4.3: Greenova teorema


Neka je $D \subset \mathbb{R}^2$ oblast ograničena dio-po-dio glatkom krivom c . Ako su funkcije $P(x, y)$ i $Q(x, y)$ neprekidne zajedno sa svojim parcijalnim izvodima $\frac{\partial P}{\partial y}$, $\frac{\partial Q}{\partial x}$, na zatvorenoj oblasti \overline{D} , tada važi jednakost

$$\oint_{c^+} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy . \quad (1.4.1)$$

Pri tome, oznaka c^+ u krivolinijskom integralu označava da se integracija vrši u smjeru pri kome tačke oblasti D uvijek ostaju s lijeve strane u odnosu na kretanje.

Dokaz : Pretpostavimo za početak da je oblast D elementarna oblast u odnosu na Ox osu. Dakle, neka je granica oblasti D kriva c određena jednačinama $y = f(x)$, $y = g(x)$ ($f(x) \leq g(x)$ za $a \leq x \leq b$), zatim sa $x = a$ i $f(a) \leq y \leq g(a)$, kao i $x = b$, $f(b) \leq y \leq g(b)$, što je predstavljeno slikom

1.4. Nezavisnost integracije od putanje. Greenova formula



Sada imamo,

$$\begin{aligned}
 \int \int_D \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} dx dy &= \int_a^b dx \int_{f(x)}^{g(x)} \frac{\partial P}{\partial y} dy \\
 &= \int_a^b (P(x, g(x)) - P(x, f(x))) dx \\
 &= \int_a^b P(x, g(x)) dx - \int_a^b P(x, f(x)) dx \\
 &= - \int_{GH} P(x, y) dx - \int_{EF} P(x, y) dx .
 \end{aligned}$$

Uzimajući u obzir da na pravama $x = a$ i $x = b$ vrijedi $dx = 0$, imamo

$$\int_{HE} P(x, y) dx = 0 \quad , \quad \int_{FG} P(x, y) dx = 0 \quad ,$$

pa zajedno sa prethodnim vrijedi

$$\int \int_D \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} dx dy = - \int_{GH} P(x, y) dx - \int_{HE} P(x, y) dx - \int_{EF} P(x, y) dx - \int_{FG} P(x, y) dx ,$$

odnosno


$$\int \int_D \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} dx dy = - \oint_{c^+} P(x, y) dx .$$

Na sličan način bi dobili

$$\int \int_D \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} dx dy = \oint_{c^+} Q(x, y) dy .$$

Sabiranjem posljednje dvije jednakosti dobijamo traženu formulu

$$\oint_{c^+} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int \int_D \left(\frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} \right) dx dy .$$



Slika 1.5: Podjela oblasti na elementarne oblasti.

Ako oblast D nije elementarna, onda je prvo pravim linijama paralelnim koordinatnim osama podijelimo na elementarne oblasti D_i , $i = 1, 2, \dots, n$, što je prikazano na slici (1.5).

Nakon toga na svaku podoblast D_i primjenimo dobijenu jednakost

$$\oint_{c_i^+} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \iint_{D_i} \left(\frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} \right) dx dy ,$$

gdje je c_i granica oblasti D_i . Sabiranjem ovih jednakosti po $i = 1, 2, \dots, n$, dobijamo formulu

$$\oint_{c^+} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} \right) dx dy .$$

Pri tome treba uočiti da se krivolinijski integral druge vrste po onim granicama susjednih oblasti koje su im zajedničke, i nalaze se unutar oblasti D , pojavljuje uvijek dva puta i to krećući se suprotnim smjerovima, pa se svi ti integrali poništavaju zbog poznate nam osobine krivolinijskog integrala druge vrste. ♣

Izvedimo i jednu primjenu krivolinijskog integrala druge vrste i Greenove teoreme. Ona se odnosi na izračunavanje površine ravnog lika.

Primjer 1.7. Neka je D zatvorena oblast u ravni Oxy , ograničena dio-po-dio glatkom krivom c . Poznato nam je da vrijedi

$$mes(D) = \iint_D dx dy .$$

S druge strane, koristeći Greenovu formulu, uzimajući $P(x, y) = 0$ i $Q(x, y) = x$, dobijamo vezu

$$\iint_D dx dy = \oint_{c^+} x dy .$$

1.4. Nezavisnost integracije od putanje. Greenova formula

Ako uzmemo $P(x, y) = -y$ i $Q(x, y) = 0$, dobija se

$$\iint_D dx dy = - \oint_{c^+} y dx .$$

Objedinjujući gornje, dobijamo formulu za izračunavanje površine ravne figure

$$mes(D) = \iint_D dx dy = \frac{1}{2} \oint_{c^+} x dy - y dx .$$


◇

U sljedećem primjeru ilustrirat ćemo primjenu Greenove teoreme u izračunavanju krivolinijskih integrala.

Primjer 1.8. Izračunati:

$$\int_c \frac{y}{x^2 + y^2} dx - \frac{x}{x^2 + y^2} dy ,$$

gdje je c luk parabole $y = x^2$, od tačke $A(-1, 1)$ do tačke $B(1, 1)$.



Oblast D koju posmatramo u Greenovoj teoremi je zatvorena i ograničena, pa je linija c koja je ograničava, zatvorena linija. Dakle, da bi mogli primjeniti Greenovu teoremu, neophodno je da putanja integracije bude zatvorena kontura, što u našem primjeru nije slučaj.

S druge strane, motiv za primjenu Greenove teoreme je činjenica da vrijedi uslov

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} ,$$

jer je u tom slučaju izraz na desnoj strani u (1.4.1) jednak 0. Kod nas je taj uslov zadovoljen, tj. vrijedi

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x} ,$$

a to znači da bi bilo dobro iskoristiti Greenov teorem. U tom cilju našu putanju integracije (dio parabole), zatvorimo proizvoljnom krivom (zatvaranje treba izvesti sa krivom po kojoj je krivolinijska integracija lahka). Neka to bude prava koja spaja tačke A i B , tj. linija

$$l : y = 1 , -1 \leq x \leq 1 .$$

1.4. Nezavisnost integracije od putanje. Greenova formula

Sada je $c \cup l$ zatvorena putanja, pa vrijedi

$$\int_{c \cup l} \frac{y}{x^2 + y^2} dx - \frac{x}{x^2 + y^2} dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0 .$$

S druge strane, prema pravilima za krivolinijski integral druge vrste, imamo

$$\int_{c \cup l} \frac{y}{x^2 + y^2} dx - \frac{x}{x^2 + y^2} dy = \int_c \frac{y}{x^2 + y^2} dx - \frac{x}{x^2 + y^2} dy + \int_l \frac{y}{x^2 + y^2} dx - \frac{x}{x^2 + y^2} dy .$$

Iz posljednje dvije jednakosti onda vrijedi

$$\int_c \frac{y}{x^2 + y^2} dx - \frac{x}{x^2 + y^2} dy = - \int_l \frac{y}{x^2 + y^2} dx - \frac{x}{x^2 + y^2} dy .$$

Kako je na krivoj l , $y = 1$, odnosno $dy = 0$, onda je

$$\int_l \frac{y}{x^2 + y^2} dx - \frac{x}{x^2 + y^2} dy = \int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2 + 1} = \operatorname{arctg} x \Big|_{-1}^1 = \frac{\pi}{2} .$$

Dakle,

$$\int_c \frac{y}{x^2 + y^2} dx - \frac{x}{x^2 + y^2} dy = -\frac{\pi}{2} .$$

◇

1.4. Nezavisnost integracije od putanje. Greenova formula
